# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号　赤坂Ａ

| 日付 | 用途別分類 | 系　　統 | 有効成分名 | 使用回数 | 使用制限 | 倍　率 | 使用量 | 対象病害虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月16日 | 種子殺菌剤 | ジチオカルバメート剤 | FM03 | 1 | － | － | － | 苗立枯病(RYアイコ処理済各1回) |
| 9月29日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 1 | － | 1000 | 500L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | ジアミド剤 | シアントラニリプロール | 1 | 3 | 2000 | | コナジラミ・アザミウマ・オオタバコガ・ハモグリバエ |
| 10月8日 | 交配剤 | 植物成長調整剤 | 4-CPA | 1 | － | 100 | 12L | ― |
| 10月14日 | 交配剤 | 植物成長調整剤 | 4-CPA | 1 | － | 100 | 6L | ― |
| 10月29日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 2 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | イソオキサゾリン剤 | フルキサメタミド | 1 | 2 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハスモンヨトウ |
| | 殺菌剤 | 炭酸水素塩剤 | 炭酸水素カリウム | 1 | － | 800 | | 灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病 |
| 11月12日 | 殺菌剤 | 微生物剤 | バチルス ズブチリス | 1 | － | － | 30g／日 | 灰色かび病・うどんこ病 |
| 11月19日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 3 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | マクロライド剤 | エマメクチン安息香酸塩 | 1 | 5 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハモグリバエ |
| | 殺菌剤 | 炭酸水素塩剤 | 炭酸水素カリウム | 2 | － | 800 | | 灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病 |
| 12月9日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 4 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | スピノシン剤 | スピネトラム | 1 | 2 | 2500 | | コナジラミ・アザミウマ・オオタバコガ・ヨトウガ・ハモグリバエ |
| | 殺虫剤 | ジアミド剤 | クロラントラニリプロール | 1 | 3 | 2000 | | オオタバコガ・ヨトウガ |
| | 殺菌剤 | 無機銅剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅 | 1 | － | 800 | | 疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病 |
| 1月8日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 5 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号　赤坂Ａ

| 日付 | 用途別分類 | 系　　統 | 有効成分名 | 使用回数 | 使用制限 | 倍　率 | 使用量 | 対象病害虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 殺虫剤 | その他合成殺虫剤 | ピメトロジン | 1 | 3 | 5000 | | コナジラミ |
| | 殺菌剤 | ストロビルリン剤 | シモキサニル・ファモキサドン | 1 | 3 | 1500 | | 疫病・葉かび病 |
| | 殺菌剤 | アミド剤 | フェンピラザミン | 1 | 4 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病 |
| 1月21日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 6 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺菌剤 | カルボン酸アミド剤 | アメトクトラジン・ジメトモルフ | 1 | 3 | 1500 | | 疫病 |
| | 殺菌剤 | ストロビルリン剤 | ピリベンカルブ | 1 | 3 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病 |
| | 殺菌剤 | 無機銅剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅 | 2 | － | 800 | | 疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病 |
| 2月3日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 7 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺菌剤 | ジエトフェンカルプ剤 | ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル | 1 | 3 | 1500 | | 灰色かび病・菌核病・葉かび病 |
| | 殺菌剤 | デリック酸アミド剤 | オキサチアピプロリン | 1 | 2 | 2000 | | 疫病 |
| 2月18日 | 殺菌剤 | ストロビルリン剤 | アゾキシストロビン | 1 | 2 | 1000 | 600L | 疫病・灰色かび病・葉かび病 |
| | 殺菌剤 | 無機銅剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅 | 3 | － | 800 | | 疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病 |
| 3月3日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 8 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | その他合成殺虫剤 | ピメトロジン | 2 | 3 | 5000 | | コナジラミ |
| | 殺菌剤 | その他合成殺菌剤 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 1 | 3 | 2000 | | 疫病 |
| | 殺菌剤 | 無機銅剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅 | 4 | － | 800 | | 疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病 |
| 3月17日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 9 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号　赤坂Ａ

| 日付 | 用途別分類 | 系　　統 | 有効成分名 | 使用回数 | 使用制限 | 倍　率 | 使用量 | 対象病害虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 殺菌剤 | 無機銅剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅 | 5 | − | 800 | | 疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病 |
| 3月31日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 10 | − | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺菌剤 | 抗生物質剤 | 塩基性塩化銅・カスガマイシン | 1 | 5 | 1000 | | 疫病・輪紋病 |
| | 殺菌剤 | アミド剤 | フェンピラザミン | 2 | 4 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病 |
| 4月13日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 11 | − | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | マクロライド剤 | エマメクチン安息香酸塩 | 2 | 5 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハモグリバエ |
| | 殺菌剤 | ジエトフェンカルプ剤 | ジエトフェンカルプ・チオファネートメチル | 2 | 3 | 1500 | | 灰色かび病・菌核病・葉かび病 |
| | 殺菌剤 | 有機硫黄剤 | マンゼブ | 1 | 2 | 1000 | | 疫病・輪紋病・すすかび病 |
| 4月29日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 12 | − | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺菌剤 | ストロビルリン剤 | ピリベンカルブ | 2 | 3 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病 |
| | 殺菌剤 | 抗生物質剤 | 塩基性塩化銅・カスガマイシン | 2 | 5 | 1000 | | 疫病・輪紋病 |
| 5月12日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 13 | − | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | マクロライド剤 | エマメクチン安息香酸塩 | 3 | 5 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハモグリバエ |
| | 殺菌剤 | アミド剤 | フェンピラザミン | 3 | 4 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病 |
| 5月26日 | 展着剤 | ポリオキシエチレン<br>アルキルフェニルエーテル | ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル | 1 | − | 10000 | 600L | ー |
| | 殺菌剤 | 無機銅剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅 | 6 | − | 800 | | 疫病・灰色かび病・すすかび病・軟腐病 |
| 6月9日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 14 | − | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号　赤坂Ａ

| 日付 | 用途別分類 | 系　　統 | 有効成分名 | 使用回数 | 使用制限 | 倍　率 | 使用量 | 対象病害虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 殺虫剤 | マクロライド剤 | エマメクチン安息香酸塩 | 4 | 5 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハモグリバエ |
| 6月22日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 15 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺菌剤 | ストロビルリン剤 | ピリベンカルブ | 3 | 3 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病・すすかび病・斑点病 |
| 7月7日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 16 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | マクロライド剤 | エマメクチン安息香酸塩 | 5 | 5 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ・ハモグリバエ |
| | 殺菌剤 | アミド剤 | フェンピラザミン | 4 | 4 | 2000 | | 灰色かび病・菌核病 |
| | 殺菌剤 | 炭酸水素塩剤 | 炭酸水素カリウム | 3 | － | 800 | | 灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病 |
| 7月21日 | 展着剤 | 物理的阻害剤 | ポリグリセリン脂肪酸エステル | 17 | － | 1000 | 600L | コナジラミ・ハダニ・うどんこ病 |
| | 殺虫剤 | イソオキサゾリン剤 | フルキサメタミド | 2 | 2 | 2000 | | コナジラミ・トマトサビダニ・ハダニ |
| | 殺菌剤 | 炭酸水素塩剤 | 炭酸水素カリウム | 4 | － | 800 | | 灰色かび病・うどんこ病・葉かび病・さび病 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 農薬使用台帳（赤坂とまと）

農産物識別番号　赤坂Ａ

| 日付 | 用途別分類 | 系　　統 | 有効成分名 | 使用回数 | 使用制限 | 倍　率 | 使用量 | 対象病害虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |